




winDiab #	jährlicher Zuwachs Diabetes-Patienten: 7,0% (exponentieller Trend)													*)
	zum Vergleich: alle Praxen: 3,4%													
Quartal	2019-4	2020-1	2020-2	2020-3	2020-4	2021-1	2021-2	2021-3	2021-4	2022-1	2022-2	2022-3	2022-4	2022
alle Diabetiker	970	1045	941	974	934	938	924	1092	1040	1127	1136	1153	1149	1608
Typ 1	181	185	163	163	153	161	159	179	176	164	166	175	171	203
Typ 2	754	783	677	751	730	730	721	860	816	915	913	931	928	1301
Typ 2 mit KHK	151	169	136	160	144	148	148	179	182	188	191	197	185	263
Typ 2 mit Hypertonie	570	603	531	570	545	548	541	649	621	702	691	717	708	976
GDM	44	91	99	45	38	34	35	42	38	37	44	35	30	99
Schwangere Typ 1														0
Schwangere Typ 2														0
Sonst. Diabetes Typen	17	17	18	21	19	19	21	20	20	23	24	22	26	31
Fußpatienten	61	65	58	53	47	69	58	63	53	57	62	71	68	88
davon Wagner 1+	127	134	123	135	113	124	112	131	117	121	142	131	138	193
Insulintherapie	556	553	398	386	332	319	291	360	596	626	629	630	629	826
Insulinpumpe	28	29	18	17	17	16	11	14	11	4	5	5	5	6
Prädiabetes	22	18	13	23	15	14	13	25	16	18	14	20	18	

\*) Jahreszahlen können nur angegeben werden, wenn alle 4 Quartale vom selben PC generiert wurden!





**ICDiab-Statistik bis zum aktuellen Quartal**

Anzahl Praxen	96
Anzahl Quartale	3.213
Anzahl Quartalsfälle	4.522.637


**Quartalsdaten Ihrer Praxis im Vergleich mit allen Praxen**

Wenn von Ihnen keine Daten im aktuellen Quartal vorliegen, fehlen in den folgenden Grafiken Ihre Werte.

**Patientenzahlen**




**Beispiel**



Wenn in den folgenden Diagrammen bei Ihnen Häufigkeitsausreißer vorkommen, erwägen Sie, ob Schwächen in der Kodierung vorliegen.

**Anteil Folge-/Begleitkrankheiten bei Typ-1-Patienten**

CVD= zerebrovaskuläre Erkrankung




**Erläuterungen**

		Ihre Praxis		Median aller Praxen
Typ-1 Nephro =	(E10.xx und N08.3) oder E10.2	48	28,1%	11,9%
Typ-1 Retino =	(E10.xx und H36.0) oder E10.3	41	24,0%	20,8%
Typ-1 PNP =	(E10.xx und G63.2) oder E10.4	31	18,1%	31,2%
Typ-1 pAVK =	(E10.xx und (I79.2 oder I70.2x)) oder	20	11,7%	7,1%
Typ-1 Hypertonie =	E10.xx und I1x.x	72	42,1%	38,6%
Typ-1 KHK =	E10.xx und (I20.x - I25.x)	13	7,6%	8,0%
Typ-1 CVD (cerebro-vask.)	E10.xx und I6x.00	8	4,7%	4,5%
Typ-1 ZnApoplex =	E10.xx und I69.x	7	4,1%	1,9%
Typ-1 Dialyse =	E10.xx und Z99.2	0	0,0%	0,3%
Typ-1 DFS =	E10.74 oder E10.75	6	3,5%	13,4%



#NV=Datens nicht vorhanden

### Anteil Folge-/Begleitkrankheiten bei Typ-2-Patienten




Erläuterungen		Ihre Praxis	Median aller Praxen
Typ-2 Nephro =	(E11.xx und N08.3) oder E11.2	297	32,0%
Typ-2 Retino =	(E11.xx und H36.0) oder E11.3	271	29,2%
Typ-2 PNP =	(E11.xx und G63.2) oder E11.4	302	32,5%
Typ-2 pAVK =	(E11.xx und (I79.2 oder I70.2x)) oder	123	13,3%
Typ-2 Hypertonie =	E11.xx und I1x.x	708	76,3%
Typ-2 KHK =	E11.xx und (I20.x - I25.x)	185	19,9%
Typ-2 CVD (cerebro-vask.)	E11.xx und I6x.x	62	6,7%
Typ-2 ZnApoplex =	E11.xx und I69.x	46	5,0%
Typ-2 Dialyse =	E11.xx und Z99.2	2	0,2%
Typ-2 DFS =	E11.74 oder E11.75	62	6,7%
#NV=Daten nicht vorhanden			

**Anteil Folge-/Begleitkrankheiten bezogen auf die Gesamtzahl aller Diabetes-Patienten**





Erläuterungen		Ihre Praxis			Median aller Praxen	
autonome Neuropathie =	G99.0	1	0,1%	0,3%		
DNOAP =	M14.6	2	0,2%	0,5%		
Niereninsuff. Stadium 1 =	N18.1	282	24,5%	0,7%		
Niereninsuff. Stadium 2 =	N18.2	68	5,9%	2,5%		
Niereninsuff. Stadium 3 =	N18.3	127	11,1%	10,4%		
Niereninsuff. Stadium 4 =	N18.4	31	2,7%	1,9%		
Niereninsuff. Stadium 5 =	N18.5	5	0,4%	0,4%		
Prädiabetes=pathol. OGT=	R73	18	1,6%	1,5%		
Magen Bypass	Z98.0	1	0,1%	0,2%		
Insulintherapie*	Z92.2	629	54,7%	39,8%	*eigentlich Dauertherapie mit anderen Arzneimitteln	
Pumpentherapie	Z96.4	5	0,4%	4,9%	(oder Z45.1)	
Blind bds.	H54.0	2	0,2%	0,3%		
Blind einseitig	H54.4	1	0,1%	0,1%		
Hyperlipidämie	E78	583	50,7%	49,4%		
"entgleist"	E1x.x1/E1x.73/E1x.74	99	8,6%	12,5%		

## Häufigkeit ausgewählter ICD-Codes in der zeitlichen Entwicklung als Gradmesser der Kodierqualität in Ihrer Praxis



## Häufigkeit ausgewählter ICD-Codes in der zeitlichen Entwicklung als Gradmesser der Kodierqualität in allen Praxen





Erläuterungen		Ihre Praxis Median aller Praxen			
Adipositas Grad 1 (30-35)	E66.x0	437	38,0%	17,7%	
Adipositas Grad 2 (35-40)	E66.x1	196	17,1%	12,3%	
BMI 40-50	E66.x6	110	9,6%	5,3%	
BMI 50-60	E66.x7	1	0,1%	0,3%	
BMI ab 60	E66.x8	0	0,0%	0,1%	
Diab. Angiopathie	I79.2	11	1,0%	5,5%	
Lipodystrophie	E88.1	93	8,1%	1,3%	
CGM/FGM	Z97.8	79	6,9%	18,3%	
Verständigungsprobleme	Z55	24	2,1%	0,3%	
Covid-19	U07.1,U07.2	14	1,2%	0,7%	
Post-Covid	U08.9,U09.9	0	0,0%	0,3%	
Herzinsuffizienz	I50.x	36	3,1%	4,7%	
Depression	F32.x	66	5,7%	7,5%	